



Grandes Cultures

DLP - 5 - 4 - 96 J U 2 4 5 2

Champagne-Ardenne

Bulletin n°312 du 2/04/96: 2 pages

d'après les observations du 1er/04/96

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuville
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33
Toute reproduction même partielle est soumise
à notre autorisation


TARIF PAPIER 350 F - FAX 420F - PAGE 1

COLZA

Insectes

Stade élongation de la tige de 3 à 15 cm à boutons accolés.

Arrêt du vol des insectes et en particulier du charançon de la tige suite aux températures basses. Cependant, l'arrêt des captures ne signifie pas arrêt de l'activité des femelles qui peuvent pondre à des températures de l'ordre de 5°C si le temps est ensoleillé et sec. Les quelques femelles capturées (5 sur 20 pièges) sont toutes gravides et prêtes à pondre. Voici les résultats des pièges où ont été enregistrées des captures ces sept derniers jours.



Meligèthe

Piégeages du 26/03 au 1/04

Lieu	C.T.colza	Meligèthe
10 Ville/Arce	0	4
Pavillon Ste Julie	2	18
Savières	2	1
Laines aux Bois	0	6
Charny le Bachot	1	3
51 Le Fresne	1	0
Sompuis	1	0
Sept-Saulx	0	2

Des pontes de charançons, parfois nombreuses, sont observées.

Pontes sur 25 plantes au 1er avril

Lieu	Nombre
Magny Fouchard	0
Pavillon Ste Julie	2
Savières	2
Charny le Bachot	7
Domprémy	6

■ **Nos conseils :** la plupart des colzas ont dû être traités. Dans les parcelles non encore protégées à cause du froid et tardives, choisir un après-midi calme et ensoleillé pour intervenir, des pontes peuvent encore avoir lieu.

La Protection des Végétaux à l'heure européenne

La Communauté Européenne va fédérer tous les Services de Protection des Végétaux des différents Etats Membres. Le principe, en préparation depuis trois ans, ne sera officiellement annoncé que lors de la prochaine réunion du Conseil des Ministres de la Communauté (actuellement présidée par l'Italie, très attachée à cette idée).

En voici les grandes lignes.

Les différents niveaux de Protection des Végétaux (dont celui de Champagne Ardenne, déjà en contact avec ses homologues voisins de la Wallonie) seront intégralement rattachés à Bruxelles. L'actuel niveau parisien n'aurait de ce fait qu'un rôle de relais.

Pour la Commission, les avantages sont nombreux:

■ meilleure cohésion des politiques et stratégies de lutte contre les ennemis des cultures (qui eux ne connaissent pas de frontières ...),

■ renforcement du dispositif de l'homologation des produits phytopharmaceutiques,

■ prise en compte plus efficace des aspects liés à l'environnement (on conçoit déjà un lien entre l'attribution des aides et les abonnements aux Avertissements ...). Pour les Etats, cette réorganisation profonde ne manque pas d'attraits non plus : on imagine sans peine les économies budgétaires importantes réalisées par les différents ministères chargés de l'agriculture.



En première analyse, les agents du SRPV Champagne Ardenne réagissent plutôt positivement à cette réorganisation : l'accès à un statut de fonctionnaire

européen avantageux et de meilleures conditions matérielles (voitures de service allemandes...) compenseront sans doute largement la contrainte de l'acquisition ou de l'entretien des langues étrangères.

COLZA : toutes les parcelles ont dû être protégées contre les insectes.

BLE : le froid bloque l'évolution des maladies. Application des régulateurs dès un réchauffement.

POIS : surveiller les thrips.

P10

4'20
23 153 03



Attention !
Depuis le 9 janvier, les autorisations de vente et l'utilisation des produits à base de dinoterbe sont modifiées. Le dinoterbe ne reste autorisé que pour le desherbage du maïs.


Surveillance des lots de pomme de terre venant des Pays-Bas. A ce jour, 138 lots ont été contrôlés, 49 ont été envoyés en analyse. Sur les 12 premiers résultats de laboratoire reçus à ce jour, tous sont négatifs vis-à-vis de la pourriture brune.

BLE

Stade début de décollement de l'épi à épi 2 cm.

Piétin-verse

Les symptômes de piétin-verse paraissent en régression par rapport aux comptages précédents. Ceci est principalement dû à la dispari-



tion (gel et sénescence) des plus vieilles gaines, le piétin n'étant pas encore visible sur les gaines plus récentes. Il n'y a toujours pas de nouvelle contamination depuis le 21 mars. Seuls les postes météo situés au sud de la région annoncent le début de la 2ème génération de piétin (en 1995, c'était le début de la 4ème génération).

■ **Nos conseils :** il est encore trop tôt pour intervenir. Le risque parcellaire ne sera pas à négliger pour décider d'une intervention spécifique : semis précoce, attaques les années précédentes...

Maladies du feuillage

Aucune évolution des principales maladies oïdium et septoriose. Le temps froid et sec freine la végétation et tout développement parasitaire. Le modèle Présept ressemble fort à 1994 mais avec des contaminations encore moins nombreuses. Même avec des températures plus dou-

ces et de la pluie pendant les 5 jours à venir, le risque septoriose augmenterait peu.

Les gelées nocturnes sur les blés les plus avancés pourraient provoquer quelques gels de l'épi.

■ **Nos conseils :** rien n'est joué ; la météo d'avril et de début mai peut encore tout faire évoluer, dans un sens comme dans l'autre au niveau septorioses et oïdium.

ORGE D'HIVER

Maladies

L'helminthosporiose reste bien présente sur feuilles basses. La rhynchosporiose est fréquente dans certaines parcelles. L'oïdium est plus discret. Des symptômes de mosaïque confirmés en laboratoire sont souvent observés.

Fréquence de F7 vraies touchées

Lieu	Helmintho	Rhyncho
08 Seraincourt	0	0
10 Méry/S	24	0
Luyères	43	0
Mersey	36	0
Rumilly les V.	63	0
Arrentières	80	8
51 Longevas	0	50
Vanault le Chatel	100	100
Faux-Vésigneul	0	0
Vitry en Perthois	0	0
St Rémy sur Bussy	0	0
La Chappe	0	0

POIS

Germination à levée.

Thrips

Aucun thrips n'a encore été observé dans les parcelles en cours de levée. Les thrips sont difficiles à observer. En cours de levée, ils sont cachés entre les cotylédons ou dans les apex des plantules.

■ **Nos conseils :** Surveiller attentivement les cultures en cours de levée. Le traitement n'est justifié qu'au stade «crosse», soit 80 % des plantes levées, si on compte au moins 1 thrips sur chaque plante observée.

Ça fait réfléchir !

Retrouvez chaque lundi matin à 7h00, sur le canal 21, l'indicateur de la réponse aux avis des Avertissements Agricoles. Au menu des informations sur l'évolution des parcelles, des révélations sur les méthodes de lutte, une rubrique sur les produits banalisés. Les flashs d'alerte phytosanitaire seront rediffusés le jour même dans les bases de données de la cellule d'émission de radio "Les Grosses Bêtes".

Depuis quelques années, de nombreux courtiers d'annonces nous font part d'une demande croissante de recevoir les Avertissements Agricoles par les CB du département de plus en plus nombreux. L'heure des autorisations de l'information, le SRPV Champagne Ardennes ne pouvait pas en rester là, et dès le début de ce mois, ce sera chose faite.